

TD3 : Dédution naturelle

Jules Chouquet

Attention, en déduction naturelle, chaque règle a un nombre de prémisses fixe.
Donc il faut mettre les parenthèses autour des connecteurs binaires.
Les formules comme $p \wedge q \wedge r$ sont interdites dans les preuves.

Exercice 1 Pour s'échauffer Donnez une preuve en déduction naturelle des formules suivantes :

1. $p \rightarrow (q \rightarrow p)$
2. $(r \rightarrow \neg(q \rightarrow s)) \rightarrow (p \rightarrow p)$
3. $((p \wedge q) \wedge r) \rightarrow (q \wedge r)$
4. $(p \wedge q) \rightarrow ((p \vee s) \wedge (q \vee s))$

Exercice 2 Raisonnements par cas Même exercice. Il faut utiliser le raisonnement par cas, c'est-à-dire la règle \vee -e.

1. $(p \vee q) \rightarrow (p \vee (q \vee r))$
2. $(p \vee \perp) \rightarrow p$
3. Démontrez la commutativité de la disjonction
4. Démontrez l'associativité de la disjonction

Exercice 3 Raisonnement par l'absurde

1. $\neg\neg p \rightarrow p$
2. (* difficile *) Loi de Peirce : $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$

Exercice 4 Propriétés des connecteurs

1. $(p \wedge \top) \rightarrow p$
2. Démontrez que la conjonction est distributive sur la disjonction, et que la disjonction est distributive sur la conjonction.